



2209190557

# 大同瑞慈健康体检

## 报 告 册

|      |             |    |        |
|------|-------------|----|--------|
| 体检编号 | 396855      | 工号 | 396855 |
| 姓名   | 赵日莲         |    |        |
| 性别   | 女           | 年龄 | 74岁    |
| 单位   | 大同市科学技术协会   |    |        |
| 部门   | 大同市科学技术协会   |    |        |
| 联系电话 | 13008048538 |    |        |
| 体检日期 | 2024-10-15  |    |        |

尊敬的 赵日莲女士 您好！

首先,瑞慈健康体检全体员工欢迎您的光临,并对您的信任表示衷心的感谢 !

您于 2024-10-15 ( 体检编号: 396855 ) 完成健康检查,本机构的各科医生已根据您的体检项目及结果,汇总成此份健康体检报告,并经总检医生审核。据此提出对您健康状况的综合分析及建议。

瑞慈健康体检倡导“大健康、大康复”,提出“健康是第一财富 (Rich)” 的人文理念。希望您仔细阅读并妥善地保管此份健康体检报告,并认真关注报告中的提示与建议,若您对报告内容有任何疑问,可直接与瑞慈健康体检客服部联系,进一步咨询。

健康体检咨询电话: **0352-2824444**

客户服务咨询电话: **0352-2830597**

**400-6112995**

瑞慈健康体检报告由下列内容组成:

第一部分: 主检报告

第二部分: 分科分项结果

第三部分: 检验报告

第四部分: 附表

## 主检报告

### 检查综述

- 【身高、体重、血压】 (1) 体重指数 25.32：超重
- 【外科（含皮肤科）】 (1) 皮肤：双下肢静脉曲张 (2) 甲状腺：稍大 (3) 浮肿：左下肢可凹性水肿 (4) 胆囊切除手术
- 【眼科】 (1) 左眼视力下降 (2) 右眼视力下降
- 【肾功三项】 肌酐(CREA)偏高(83.80 umol/L)
- 【空腹血糖】 葡萄糖(GLU)偏高(10.04 mmol/L)
- 【血脂四项】 总胆固醇(CHOL)偏高(6.25 mmol/L) 甘油三脂(TG)偏高(1.84 mmol/L)
- 【尿常规】 鳞状上皮细胞偏高(30 /HP) 粘液丝偏高(13 /HP)
- 【心电图】 1. 窦性心律 2. 逆钟向转位 3. T波改变(II, III, aVF)
- 【全腹彩超】 胆囊切除术后 胆总管上段内径扩张
- 【内科】 (1) 其它：双小腿一度肿

### 医生建议

#### 【超重】：

- 体重指数是判断体重超标或偏低的主要指标。体重是反映和衡量一个人健康状况的重要标志之一，过胖和过瘦都不利于健康，身高体重不协调也不会给人以美感。体重的变化，还会直接反映身体长期的热量平衡状态。
- 当需要比较及分析一个人的体重对于不同身高的人所带来的健康影响时，体重指数是一个中立而可靠的指标。其主要适用于需要体重测试、体型肥胖和全身检查的人群。
- 体重指数(BMI)是世界卫生组织推荐的国际统一使用的肥胖分型标准，也是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准，其计算方式为： $BMI = \text{体重(千克)} / \text{身高(米} \times \text{米)}$ 。成人的标准值是BMI18.5-23.9之间。低于18.5为体重指数偏低；高于23.9则为体重指数偏高。
- 一般表现为体重超重或肥胖，超重及肥胖会出现一系列代谢性疾病，如高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症等，所以体重指数偏高者一定要注意控制体重。
- 合理控制饮食，食品多样化，食物纤维可适量增加，饮食规律，避免暴饮暴食，低盐、低脂饮食为主，减少高热量食物的摄入。
- 加强体育锻炼，每天最少保持30分钟的中等强度运动。鼓励每天至少快步走6000步比较健康。肥胖患者不适合较剧烈的运动，会加重膝关节的负担，可以选择游泳、划船等对膝关节负荷较小的运动。
- 定期检查血糖、血脂、肝功、肝脏B超等，积极治疗基础性疾病。
- 减少热量摄取及增加热量消耗。强调以健康行为、饮食、运动为主的综合治疗。

#### 【胆囊切除手术】：

- 建议外科定期复查

#### 【甲状腺：稍大】：

- 建议外科诊断治疗。

#### 【双下肢静脉曲张】：

(1) 静脉曲张是由于静脉瓣膜功能不全，血液回流不畅，静脉管壁薄弱等因素发生代偿性的静脉迂曲扩张。建议外科结合临床诊治。

**【左下肢可凹性水肿】：**

(1) 建议内科进一步复查。

**【左眼视力下降】：**

(1) 视力下降是由角膜白斑或角膜炎、晶状体混浊、眼底疾病、屈光不正等原因引起，建议眼科诊断治疗。

**【右眼视力下降】：**

(1) 视力下降是由角膜白斑或角膜炎、晶状体混浊、眼底疾病、屈光不正等原因引起，建议眼科诊断治疗。

**【肌酐(CREA)偏高】：**

(1) 临床上肾功能检查项目很多，常规体检一般只做三项测定，即血肌酐(Cr)、血尿素氮(BUN)、尿酸(UA)，通过这三项可初筛肾功能的情况。

(2) 血肌酐(Cr)由外源性和内源性两类组成。血肌酐是肌肉中肌酸代谢的最终产物，产生之后会被血液运到肾脏由肾小球滤过排出体外，肾小管基本不吸收且分泌量较少。

(3) 在外源性肌酐摄入量保持稳定的情况下，血中肌酐浓度取决于肾小球滤过能力，当肾实质损害，肾小球滤过率下降至正常人的1/3时肌酐浓度就会明显上升，故测定肌酐浓度可作为肾小球滤过受损的指标，也是判定肾功能是否受损的重要指标。

(4) 血肌酐升高常见于各种原因引起的滤过功能减退，如慢性肾衰竭；另外如果血肌酐在正常高值附近，就要引起重视了，若同时尿常规也有问题，建议尽快前往肾内科诊治。

(5) 在临床上如果肉食摄入过多、体育活动多导致肌肉分解代谢旺盛、体型强壮的人肌酐水平易偏高；反之，长期素食、卧床、肌肉萎缩、体型瘦小的人肌酐水平易偏低，需要饮食均衡，加强蛋白质的摄入。

**【葡萄糖(GLU)偏高】：**

(1) 正常情况下，人体中糖的分解和合成代谢处于动态平衡，保持相对恒定。血清葡萄糖是指血液中的葡萄糖浓度，是诊断糖尿病最重要检查项目之一。

(2) 空腹血糖偏高可分为生理性偏高（如餐后、高糖饮食、剧烈运动、情绪激动等均可引起一过性增高，经过休息后血糖值可以恢复正常）和病理性增高（如糖尿病、甲状腺功能亢进、库欣综合征等）。

(3) 空腹血糖生理性增高经过调整饮食结构、避免剧烈活动、控制情绪等方式后可自行缓解，血糖值可以恢复正常。

(4) 排除生理性增高因素经复查仍然增高者属于病理性增高，应及时到内分泌科复诊，明确血糖偏高的原因及所患疾病的种类。

(5) 如果是首次检查发现血糖偏高，应及时到医院内分泌科进行详细的检查及正规的治疗。

(6) 已确诊的糖尿病患者，如血糖仍较高则说明血糖控制不佳，应及时到医院内分泌科诊治，修正以往的治疗方案及改变一些不良的生活习惯。

(7) 糖尿病的治疗强调早期治疗、长期治疗、综合治疗和措施个体化，综合防治包括糖尿病教育、饮食治疗、体育锻炼、药物治疗和血糖监测五个方面。

**【总胆固醇(CHOL)偏高】：**

(1) 总胆固醇是脂质的主要成分之一，其数量受年龄、家族、性别、饮食、遗传等多种因素影响。总胆固醇对人体生长发育以及新陈代谢有重要的作用，正常值是2.59-5.20mmol/L。

(2) 总胆固醇升高后，会增加类脂物质的堆积，会产生更多的血管斑块，进而增加心脑血管疾病的风险。大于5.21-5.69mmol/L是胆固醇的临界偏高，即使是一个完全健康的人，只要总胆固醇>7.2mmol/L或低密度脂蛋白>4.9mmol/L，未来发生心脑血管的风险就明显增高，应该马上治疗。

(3) 总胆固醇升高根据病因可分为两大类：一是原发性，是由于遗传因素缺陷所致，另一种是继发性，可引起其升高的疾病主要有糖尿病、高血压、甲减、肝肾疾病等。

(4) 降低总胆固醇的治疗中，原发性偏高应积极应用降脂药，曾经选择他汀类药物，胆固醇不能达标的，可联合用药（如依折麦布等）。

- (5)如果总胆固醇偏高，且患者有糖尿病、高血压、甲减、肝肾疾病或者已经发生心脑血管疾病的人更应积极用药，控制降低疾病风险。
- (6)戒烟，增强运动，采用低脂、低糖饮食，少食富含脂肪、胆固醇及饱和脂肪酸的食物，多进食蔬菜、水果、豆制品、粗粮、鱼和高纤维食品。
- (7)必要时在医师指导下使用降脂药物治疗，并前往内分泌科复诊。

**【甘油三脂(TG)偏高】：**

- (1)甘油三酯是甘油和脂肪酸所构成的有机化合物，甘油三酯测定是脂类代谢的重要指标之一。
- (2)甘油三酯增高与冠心病的发生有着重要的相关性，随年龄增大而有上升的趋势，其增高最常见于高脂和过量糖类饮食、肥胖等。
- (3)甘油三酯主要功能是为机体提供能量，其正常值在 0.7-1.7mmol/L 之间，1.7-2.29mmol/L 为边缘增高，提示应该注意饮食和运动了。
- (4)甘油三酯大于 2.3mmol/L，就称为高甘油三酯血症。甘油三酯增高虽然不会直接导致血管斑块的形成，但也会间接引起心脑血管疾病风险增加，同时，当甘油三酯大于 5.6mmol/L 时，还会增加急性胰腺炎的风险，所以降低甘油三酯的基础主要是控制饮食，饮食控制不佳可以选择药物治疗。
- (5)生活方式的干预是控制甘油三酯水平升高的基础，包括减重，增加运动量，限制酒精摄入以及避免食用果糖和高碳水化合物食物。多食蔬菜水果，定期复查。
- (6)明显增高者在医师的指导下使用降脂药物治疗，首选他汀和贝特类药物。

**【鳞状上皮细胞偏高】：**

- (1)在生理情况下，机体正常的新陈代谢都会引起鳞状上皮细胞的脱离，这是一种正常的机体现象。如果长时间出现鳞状上皮细胞偏高的现象时，则有可能是尿路感染、泌尿系统结石等因素导致，应及时往泌尿外科进一步诊断治疗。

**【粘液丝偏高】：**

- (1)尿常规中粘液丝是由尿路中细胞分泌出来的，在有尿路感染时分泌会明显增多，且伴有炎症细胞的出现。
- (2)粘液丝偏高，可分为生理性偏高和病理性偏高两种，生理性偏高一般是由于喝水较少导致的尿液浓缩，一般在喝水后就能达到稀释的效果。
- (3)病理性的粘液丝偏高是由于泌尿系炎症或者是前列腺炎导致的，需要注意观察，多喝水，同时有白细胞等炎症细胞增多时，应及时服用抗感染药物治疗。如果仅有粘液丝的增多而没有白细胞等炎症细胞增多时，尿路有炎症的可能性不大。
- (4)建议平时饮食注意清淡，多喝水，少吃油腻和辛辣的食物，要注意个人清洁卫生，勤洗阴部，注意休息。

**【T波改变】：**

- (1)可见于心肌劳损，电解质紊乱及神经调节异常，如疲劳,精神紧张等，往心血管内科咨询，进一步查找病因及治疗。

**【逆钟向转位】：**

- (1)建议心内科结合临床

**【胆囊切除术后&胆总管上段内径扩张】：**

- (1)建议肝胆外科定期复查。
- (2)建议肝胆外科诊断治疗。

**【双小腿一度肿】：**

- (1)建议内科进一步复查。

汇总医生： 樊兴国

主检日期： 2024-10-16

主检医生：

## 分科结果

## 身高、体重、血压

| 项目名称 | 检查结果       | 项目名称 | 检查结果 |
|------|------------|------|------|
| 身高   | 159cm      | 体重   | 64kg |
| 血压   | 129/62mmHg |      |      |

## \*小结:

(1) 体重指数 25.32: 超重

操作员：杨柳庆

检查日期:2024-10-15

检查医生：名燕凌

## 内科

| 项目名称 | 检查结果     | 项目名称 | 检查结果    |
|------|----------|------|---------|
| 心率   | 85 次/min | 心律   | 齐       |
| 心脏杂音 | 无        | 心界   | 正常      |
| 肺部   | 正常       | 呼吸音  | 呼吸音清    |
| 啰音   | 未闻及      | 叩诊   | 叩诊呈清音   |
| 腹部触诊 | 腹部平软     | 发育   | 正常      |
| 肝胆   | 肋下未触及    | 脾脏   | 肋下未触及   |
| 双肾   | 无叩击痛     | 肠鸣音  | 正常      |
| 营养   | 良好       | 神经系统 | 正常      |
| 生理反射 | 生理反射存在   | 病理反射 | 病理反射未引出 |
| 颅神经  | 正常       | 运动功能 | 正常      |
| 深浅感觉 | 正常       | 其它   | 双小腿一度肿  |
| 既往史  | 无        |      |         |

## \*小结:

(1) 其它：双小腿一度肿

操作员：杨淑兰

检查日期:2024-10-15

检查医生：杨淑兰

## 外科（含皮肤科）

| 项目名称   | 检查结果    | 项目名称 | 检查结果     |
|--------|---------|------|----------|
| 皮肤     | 双下肢静脉曲张 | 甲状腺  | 稍大       |
| 浅表淋巴结  | 无肿大     | 肛门   | 拒检       |
| 泌尿外生殖器 | 正常      | 四肢关节 | 未见异常     |
| 腹股沟    | 未见异常    | 足背动脉 | 正常       |
| 紫绀     | 无       | 色素沉着 | 无        |
| 脱毛     | 无       | 脱色   | 无        |
| 皮疹     | 无       | 浮肿   | 左下肢可凹性水肿 |
| 皮下结节   | 无       | 头颅   | 正常       |
| 颈部     | 正常      | 乳腺   | 正常       |
| 脊柱     | 正常      | 直肠   | 未检       |
| 皮肤黄疸   | 无       | 既往史  | 胆囊切除手术   |
| 其他     | 无       |      |          |

## \*小结：

- （1）皮肤：双下肢静脉曲张
- （2）甲状腺：稍大
- （3）浮肿：左下肢可凹性水肿
- （4）胆囊切除手术

操作员：魏利平

检查日期：2024-10-15

检查医生：魏利平

## 眼科

| 项目名称  | 检查结果 | 项目名称  | 检查结果 |
|-------|------|-------|------|
| 视力(左) | 0.4  | 视力(右) | 0.25 |
| 辨色力   | 正常   | 眼睑    | 正常   |
| 结膜    | 正常   | 泪器    | 正常   |
| 角膜    | 正常   | 虹膜    | 正常   |

|     |    |     |      |
|-----|----|-----|------|
| 瞳孔  | 正常 | 晶状体 | 正常   |
| 玻璃体 | 正常 | 眼底  | 未见异常 |

**\*小结：**

(1) 左眼视力下降

(2) 右眼视力下降

操作员：田野青

检查日期：2024-10-15

检查医生：田野青

---

## 检验报告

## 尿常规

| 项目名称        | 检查结果  | 单位   | 参考值          | 提示 |
|-------------|-------|------|--------------|----|
| 胆红素(BIL)    | -     |      | 阴性           |    |
| 隐血(ERY)     | -     |      | 阴性           |    |
| 小圆上皮细胞(SRC) | 0     | 个/ul | 0--0         |    |
| 维生素 C       | -     |      | 阴性           |    |
| 异常红细胞       | 0     | 个/ul | 0--3         |    |
| 红细胞（正常）     | 5     | 个/ul | 0--6         |    |
| 鳞状上皮细胞      | 30    | 个/ul | 0--0         | ↑  |
| 粘液丝         | 13    | 个/ul | 0--0         | ↑  |
| 尿葡萄糖(GLU)   | -     |      | 阴性           |    |
| 酮体(KET)     | -     |      | 阴性           |    |
| 比重(SG)      | 1.020 |      | 1.003--1.030 |    |
| 酸碱度(PH)     | 6.0   |      | 4.5--8.0     |    |
| 尿蛋白质(PRO)   | -     |      | 阴性           |    |
| 尿胆原(URO)    | -     |      | 阴性           |    |
| 亚硝酸盐(NIT)   | -     |      | 阴性           |    |
| 尿白细胞(LEU)   | -     |      | 阴性           |    |

## \*小结:

鳞状上皮细胞偏高(30 /HP) 粘液丝偏高(13 /HP)

操作员：黄璐瑶 检查日期:2024-10-15 检查医生:康健忠

## 血常规（五分类）

| 项目名称         | 检查结果 | 单位                 | 参考值      | 提示 |
|--------------|------|--------------------|----------|----|
| 白细胞(WBC)     | 5.67 | 10 <sup>9</sup> /L | 3.5--9.5 |    |
| 淋巴细胞绝对值(LY#) | 2.30 | 10 <sup>9</sup> /L | 1.1--3.2 |    |

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| 淋巴细胞百分比(LY%)        | 40.5  | %                   | 20--50     |
| 中性粒细胞绝对值(GR#)       | 3.01  | 10 <sup>9</sup> /L  | 1.8--6.3   |
| 中性粒细胞百分比(GR%)       | 53.1  | %                   | 40--75     |
| 嗜碱性粒细胞绝对值(BA#)      | 0.02  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0--0.06    |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BA%)      | 0.4   | %                   | 0--1.0     |
| 嗜酸性粒细胞绝对值(EO#)      | 0.07  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0.02--0.52 |
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%)      | 1.3   | %                   | 0.4--8.0   |
| 血小板(PLT)            | 197   | 10 <sup>9</sup> /L  | 125--350   |
| 血小板分布宽度(PDW)        | 16.4  | %                   | 15--17     |
| 平均血小板体积(MPV)        | 11.6  | fl                  | 6.0--14.0  |
| 血小板压积(PCT)          | 0.229 | %                   | 0.11--0.28 |
| 红细胞(RBC)            | 4.56  | 10 <sup>12</sup> /L | 3.8--5.1   |
| 血红蛋白                | 142   | g/L                 | 115--150   |
| 红细胞压积(HCT)          | 43.5  | %                   | 35--45     |
| 红细胞平均体积(MCV)        | 95.2  | fl                  | 82--100    |
| 平均血红蛋白含量(MCH)       | 31.0  | pg                  | 27--34     |
| 平均血红蛋白浓度(MCHC)      | 326   | g/L                 | 316--354   |
| 单核细胞绝对值(MO#)        | 0.27  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0.1--0.60  |
| 单核细胞百分比(MO%)        | 4.7   | %                   | 3--10      |
| 红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)  | 44.9  | fl                  | 35--56     |
| 红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV) | 12.6  | %                   | 10.6--16.6 |
| 大血小板比率              | 36.7  | %                   | 11--45     |
| 大血小板数目              | 72    | 10 <sup>9</sup> /L  | 30--90     |
| 未成熟粒细胞数目            | 0.01  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0--999     |
| 未成熟粒细胞百分比           | 0.2   | %                   | 0--100     |
| 有核红细胞数目             | 0.000 | 10 <sup>9</sup> /L  | 0--9999    |

|          |      |         |         |  |
|----------|------|---------|---------|--|
| 有核红细胞百分比 | 0.00 | /100WBC | 0--9999 |  |
|----------|------|---------|---------|--|

**\*小结:**

未见异常

操作员：乔叶 检查日期:2024-10-15 检查医生:康建忠

**肾功三项**

| 项目名称        | 检查结果   | 单位     | 参考值      | 提示 |
|-------------|--------|--------|----------|----|
| 肌酐(CREA)    | 83.80  | umol/L | 41--81   | ↑  |
| 尿酸(UA)      | 307.00 | umol/L | 140--340 |    |
| 尿素测定 (Urea) | 6.30   | mmol/L | 3.1--8.8 |    |

**\*小结:**

肌酐(CREA)偏高(83.80 umol/L)

操作员：乔叶 检查日期:2024-10-15 检查医生:康建忠

**空腹血糖**

| 项目名称     | 检查结果  | 单位     | 参考值       | 提示 |
|----------|-------|--------|-----------|----|
| 葡萄糖(GLU) | 10.04 | mmol/L | 3.89--6.1 | ↑  |

**\*小结:**

葡萄糖(GLU)偏高(10.04 mmol/L)

操作员：刘慧芳 检查日期:2024-10-15 检查医生:康建忠

**血脂四项**

| 项目名称        | 检查结果 | 单位     | 参考值        | 提示 |
|-------------|------|--------|------------|----|
| 动脉硬化指数      | 2.21 |        | 1.31--3.19 |    |
| 总胆固醇(CHOL)  | 6.25 | mmol/L | 2.59--5.2  | ↑  |
| 甘油三脂(TG)    | 1.84 | mmol/L | 0.7--1.7   | ↑  |
| 低密度脂蛋白(LDL) | 3.34 | mmol/L | 0--4.13    |    |
| 高密度脂蛋白(HDL) | 1.51 | mmol/L | 0.77--1.55 |    |

**\*小结：**

总胆固醇(CHOL)偏高(6.25 mmol/L) 甘油三脂(TG)偏高(1.84 mmol/L)

操作员：刘慧芳 检查日期:2024-10-15 检查医生:康建忠

**肝功能两项**

| 项目名称           | 检查结果  | 单位  | 参考值    | 提示 |
|----------------|-------|-----|--------|----|
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT)  | 13.00 | U/L | 7--40  |    |
| 门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 13.00 | U/L | 13--35 |    |

**\*小结：**

未见异常

操作员：刘慧芳 检查日期:2024-10-15 检查医生:康建忠

# 大同瑞慈康复医院 12导联心电图报告

赵日莲 女 74岁

体检号:396855

病床号:


诊断结果:

- 1.窦性心律
- 2.逆钟向转位
- 3.丁波改变(II,III,aVF)

诊断医生:

*张生 阎志娟*

HR : 76bpm [60~100bpm]  
 P : 99ms [0~110ms]  
 PR : 151ms [120~200ms]  
 QRS : 85ms [60~100ms]  
 QT/QTc : 390/440ms [320~440/0~460ms]  
 P/QRS/T : 65/66/17deg. [0~75/-30~90/0~75deg]  
 RV5/SV1 : 2.015/0.102mV [0.0~2.5/0.0~2.0mV]



检查时间:2024-10-15 09:31:28

诊断时间:2024-10-15 09:47:18

SEMIP V1 90

仅供临床参考

Rich 大同瑞慈康复医院  
超声诊断图文报告

流水号: 2209190557

超声号: 1713963

姓名: 赵日莲

年龄: 74 岁

性别: 女

检查设备: Vivid E95

体检号: 396855

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 全腹彩超

经典图像:



影像所见:

肝脏大小形态正常, 包膜光滑完整, 实质回声均匀, 肝内管道系统走行清晰, 门静脉及肝内胆管不扩张。  
胆囊切除术后, 胆总管上段内径宽约 1.2cm, 向下逐渐变细, 胰头段内径宽约 0.4cm, 其内未见明显异常回声。  
胰腺大小形态正常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。  
脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 脾门静脉不宽。  
双肾大小形态正常, 皮髓质分界清晰, 集合系统未见分离, 双侧输尿管未见扩张。  
膀胱未充盈。

影像诊断:

胆囊切除术后 胆总管上段内径扩张

报告医师: 李菊蓉

检查日期: 2024-10-15

审核医师: 侯爱兰

报告日期: 2024-10-15



注: 本报告仅供临床医生参考!

地址: 大同市魏都大道 79 号。若有疑问, 请致电: 0352---2830580