



2212270539

# 大同瑞慈健康体检

## 报 告 册

|      |             |    |     |
|------|-------------|----|-----|
| 体检编号 | 409631      | 工号 | 4   |
| 姓名   | 孙进峰         |    |     |
| 性别   | 男           | 年龄 | 49岁 |
| 单位   | 广灵税务局       |    |     |
| 部门   | 广灵税务局       |    |     |
| 联系电话 | 18003521349 |    |     |
| 体检日期 | 2024-07-23  |    |     |

尊敬的孙进峰先生您好！

首先，瑞慈健康体检全体员工欢迎您的光临，并对您的信任表示衷心的感谢！

您于 2024-07-23 （体检编号：409631）完成健康检查，本机构的各科医生已根据您的体检项目及结果，汇总成此份健康体检报告，并经总检医生审核。据此提出对您健康状况的综合分析及建议。

瑞慈健康体检倡导“大健康、大康复”，提出“健康是第一财富（Rich）”的人文理念。希望您仔细阅读并妥善地保管此份健康体检报告，并认真关注报告中的提示与建议，若您对报告内容有任何疑问，可直接与瑞慈健康体检客服部联系，进一步咨询。

健康体检咨询电话：**0352-2824444**

客户服务咨询电话：**0352-2830597**  
**400-6112995**

瑞慈健康体检报告由下列内容组成：

第一部分：主检报告

第二部分：分科分项结果

第三部分：检验报告

第四部分：附表

## 主检报告

## 检查综述

- 【身高、体重、血压】 (1) 体重指数 28.70：超重
- 【生化全项 2】 尿酸(UA)偏高(432.00  $\mu\text{mol/L}$ ) C 反应蛋白偏高(4.50  $\text{mg/L}$ ) 动脉硬化指数偏高(6.39) 总胆固醇(CHOL)偏高(5.68  $\text{mmol/L}$ ) 甘油三脂(TG)偏高(1.88  $\text{mmol/L}$ ) 低密度脂蛋白(LDL)偏高(5.88  $\text{mmol/L}$ )
- 【尿常规】 粘液丝偏高(16 /HP)
- 【全腹彩超】 1. 脂肪肝(轻度) 2. 胆囊息肉(多发)

## 医生建议

## 【超重】：

(1) 体重指数是判断体重超标或偏低的主要指标。体重是反映和衡量一个人健康状况的重要标志之一，过胖和过瘦都不利于健康，身高体重不协调也不会给人以美感。体重的变化，还会直接反映身体长期的热量平衡状态。

(2) 当需要比较及分析一个人的体重对于不同身高的人所带来的健康影响时，体重指数是一个中立而可靠的指标。其主要适用于需要体重测试、体型肥胖和全身检查的人群。

(3) 体重指数(BMI)是世界卫生组织推荐的国际统一使用的肥胖分型标准，也是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准，其计算方式为： $\text{BMI}=\text{体重}(\text{千克})/\text{身高}(\text{米}\times\text{米})$ 。成人的标准值是 BMI18.5-23.9 之间。低于 18.5 为体重指数偏低；高于 23.9 则为体重指数偏高。

(4) 一般表现为体重超重或肥胖，超重及肥胖会出现一系列代谢性疾病，如高血压、高血糖、高血脂、高尿酸血症等，所以体重指数偏高者一定要注意控制体重。

(5) 合理控制饮食，食品多样化，食物纤维可适量增加，饮食规律，避免暴饮暴食，低盐、低脂饮食为主，减少高热量食物的摄入。

(6) 加强体育锻炼，每天最少保持 30 分钟的中等强度运动。鼓励每天至少快步走 6000 步比较健康。肥胖患者不适合较剧烈的运动，会加重膝关节的负担，可以选择游泳、划船等对膝关节负荷较小的运动。

(7) 定期检查血糖、血脂、肝功、肝脏 B 超等，积极治疗基础性疾病。

(8) 减少热量摄取及增加热量消耗。强调以健康行为、饮食、运动为主的综合治疗。

## 【尿酸(UA)偏高】：

(1) 尿酸(UA)是体内嘌呤代谢的最终产物。食物中的核酸分解生成嘌呤，体内组织中的核酸分解成嘌呤核苷，嘌呤和嘌呤核苷经过分解脱氨及氧化作用生成尿酸(UA)。

(2) 大部分的尿酸由肾脏排出，其余在肝脏分解破坏或随胆汁排泄。肾脏在排泄尿酸过程中，由肾小球滤出尿酸，若肾功能不好的人，排泄功能差，尿中排出的尿酸少了，血尿酸就会增高。

(3) 常见于肾脏疾病(如急性慢性肾炎、肾结核、肾积水晚期等)；还可见于长期吃高嘌呤食物，如动物内脏、海鲜、贝类等，这种情况下，若不控制饮食，导致嘌呤长期偏高，即使肾功能正常，也会受高浓度尿酸的影响。

(4) 另外，需要警惕的是，若尿酸长期偏高，会由尿酸盐结晶沉积引起痛风性关节炎、慢性间质性肾炎，血尿酸增高是诊断痛风的主要依据。

(5) 应避免食用含嘌呤高的食物，如各种动物内脏、豆制品、海鲜等，不要喝酒，尤其是啤酒。忌酸性食物，忌醋，多饮水，每日尿量在 2 公升以上，碱化尿液。

(6) 必要时在肾内科医生指导下进行降尿酸治疗，定期复查。

**【总胆固醇(CHOL)偏高】：**

- (1)总胆固醇是脂质的主要成分之一，其数量受年龄、家族、性别、饮食、遗传等多种因素影响。总胆固醇对人体生长发育以及新陈代谢有重要的作用，正常值是 2.59-5.20mmol/L。
- (2)总胆固醇升高后，会增加类脂物质的堆积，会产生更多的血管斑块，进而增加心脑血管疾病的风险。大于 5.21-5.69mmol/L 是胆固醇的临界偏高，即使是一个完全健康的人，只要总胆固醇 $>7.2$ mmol/L 或低密度脂蛋白 $>4.9$ mmol/L，未来发生心脑血管的风险就明显增高，应该马上治疗。
- (3)总胆固醇升高根据病因可分为两大类：一是原发性，是由于遗传因素缺陷所致，另一种是继发性，可引起其升高的疾病主要有糖尿病、高血压、甲减、肝肾疾病等。
- (4)降低总胆固醇的治疗中，原发性偏高应积极应用降脂药，曾经选择他汀类药物，胆固醇任不能达标的，可联合用药（如依折麦布等）。
- (5)如果总胆固醇偏高，且患者有糖尿病、高血压、甲减、肝肾疾病或者已经发生心脑血管疾病的人更应积极用药，控制降低疾病风险。
- (6)戒烟，增强运动，采用低脂、低糖饮食，少食富含脂肪、胆固醇及饱和脂肪酸的食物，多进食蔬菜、水果、豆制品、粗粮、鱼和高纤维食品。
- (7)必要时在医师指导下使用降脂药物治疗，并前往内分泌科复诊。

**【动脉硬化指数偏高】：**

- (1)动脉硬化指数偏高，提示动脉硬化的风险性会更高，也就是心脑血管疾病的发病率会相对较高。建议控制血脂、血糖，少吃油腻食物，多吃蔬菜水果，加强锻炼，减轻体重。

**【C 反应蛋白偏高】：**

- (1)建议内科结合临床参考。

**【甘油三酯(TG)偏高】：**

- (1)甘油三酯是甘油和脂肪酸所构成的有机化合物，甘油三酯测定是脂类代谢的重要指标之一。
- (2)甘油三酯增高与冠心病的发生有着重要的相关性，随年龄增大而有上升的趋势，其增高最常见于高脂和过量糖类饮食、肥胖等。
- (3)甘油三酯主要功能是为机体提供能量，其正常值在 0.7-1.7mmol/L 之间，1.7-2.29mmol/L 为边缘增高，提示应该注意饮食和运动了。
- (4)甘油三酯大于 2.3mmol/L，就称为高甘油三酯血症。甘油三酯增高虽然不会直接导致血管斑块的形成，但也会间接引起心脑血管疾病风险增加，同时，当甘油三酯大于 5.6mmol/L 时，还会增加急性胰腺炎的风险，所以降低甘油三酯的基础主要是控制饮食，饮食控制不佳可以选择药物治疗。
- (5)生活方式的干预是控制甘油三酯水平升高的基础，包括减重，增加运动量，限制酒精摄入以及避免食用果糖和高碳水化合物食物。多食蔬菜水果，定期复查。
- (6)明显增高者在医师的指导下使用降脂药物治疗，首选他汀和贝特类药物。

**【低密度脂蛋白(LDL)偏高】：**

- (1)在血脂检查中，我们最该关注的是低密度脂蛋白，这是因为这些指标与心脑血管疾病的关系最为密切，正常值为 0-4.13mmol/L。
- (2)低密度脂蛋白有三个标准：普通人应 $\leq 3.4$ mmol/L，没有任何高危因素的人，其低密度脂蛋白最好控制在 3.4mmol/L 以下。
- (3)高危人群应 $\leq 2.6$ mmol/L，有高血压、糖尿病、家族史、肥胖，或低度脂蛋白 $\geq 4.9$ mmol/L，这些人的低密度脂蛋白最好降低至 2.6mmol/L 以下。
- (4)极高危人群应 $\leq 1.8$ mmol/L，有冠心病、心肌梗塞、心绞痛、脑梗死、冠状动脉植入支架术后、心脏搭桥术后、严重的颈动脉斑块等缺血性心脑血管疾病的人，这些人低密度脂蛋白最好控制到 1.8mmol/L 以下。
- (5)建议低脂、低糖饮食，戒烟酒，多食蔬菜。定期复查血脂，明显增高者，在医师指导下使用降脂药物治疗，在积极治疗原发疾病的基础上降低低密度脂蛋白。

**【粘液丝偏高】：**

- (1)尿常规中粘液丝是由尿路中细胞分泌出来的，在有尿路感染时分泌会明显增多，且伴有炎症细胞的出现。

(2) 粘液丝偏高，可分为生理性偏高和病理性偏高两种，生理性偏高一般是由于喝水较少导致的尿液浓缩，一般在喝水后就能达到稀释的效果。

(3) 病理性的粘液丝偏高是由于泌尿系炎症或者是前列腺炎导致的，需要注意观察，多喝水，同时有白细胞等炎症细胞增多时，应及时服用抗感染药物治疗。如果仅有粘液丝的增多而没有白细胞等炎症细胞增多时，尿路有炎症的可能性不大。

(4) 建议平时饮食注意清淡，多喝水，少吃油腻和辛辣的食物，要注意个人清洁卫生，勤洗阴部，注意休息。

#### 【脂肪肝】：

(1) 脂肪肝是指肝脏被脂肪浸润，为一种多病因引起的获得性疾病。

(2) 脂肪肝是以肝细胞脂肪变性和脂肪蓄积为病理特征，最常见易患因素有超重或肥胖、进食油腻食物、高脂血症（尤其甘油三酯升高）、营养失调（营养过量或不足）、饮酒、高脂血症、少运动、糖耐量异常、减肥造成体重急剧下降、营养不良、中毒和药物等。

(3) 当肝内脂类（主要为甘油三酯）含量超过肝重的5%时为脂肪肝。脂肪肝是一个常见的临床现象，不是一个独立性的疾病。

(4) 值得注意的是，过多的脂肪在肝组织、肝细胞内浸润，引起肝细胞肿大，严重可致肝硬化。脂肪肝是可逆性的，合理饮食、运动及治疗后可恢复。

(5) 合理控制饮食，控制总摄入量，低盐、低脂和低糖类饮食，少吃动物内脏，多吃蔬菜水果；

(6) 控制危险因素，如控制体重、改善胰岛素抵抗、调整血脂紊乱，戒酒、戒烟，坚持长期有氧运动，加强体育锻炼；

(7) 定期复查腹部彩超、血脂、肝功能。

#### 【胆囊息肉】：

(1) 胆囊息肉又称胆囊隆起样病变，其临床症状无特异性，大部分患者为查体时所发现。主要症状为中上腹部隐痛。发病年龄多在30~50岁，以中青年为主。

(2) 一般认为，胆囊息肉是胆囊癌的诱发因素，如胆囊息肉大于1cm时，最好先行手术治疗，以杜绝胆囊癌的发生。

(3) 胆囊息肉临床特点有，一是发病率逐渐增高。高胆固醇饮食、长期酗酒、过多进食刺激性饮食、饮食规律紊乱如：不吃早餐、晚餐过盛、过多等不良饮食习惯多可造成胆囊息肉的形成；

(4) 二是隐蔽攻击性强。胆囊息肉多无症状，85%以上的患者都是在例行体检中发现。3-4mm以下的息肉在CT和核磁共振中难以发现或常常漏诊；

(5) 禁酒及含酒精类饮料，因酒精在体内主要通过肝脏分解、解毒，所以，酒精可直接损伤肝功能，引起肝功能失调，使胆汁的分泌、排出过程紊乱，从而刺激胆囊息肉增长。

(6) 饮食规律、吃好早餐对胆囊息肉患者很重要。肝脏主要分泌胆汁，分泌的胆汁存储入胆囊内，而胆汁的功能主要是消化油性食物。如果不吃早餐，胆汁在胆囊内滞留时间长，可刺激胆囊形成胆囊息肉或使原来的息肉增大或发生变化。所以，要调配营养丰富的早餐和养成吃早餐的生活习惯。

(7) 低胆固醇饮食，胆固醇摄入过多，可加重肝胆的代谢负担，并引起多余的胆固醇在胆囊壁结晶、积聚和沉淀，从而形成息肉，所以，胆囊息肉患者应降低胆固醇摄入量，尤其是晚上，应避免进食高胆固醇类食品，如鸡蛋（尤其是蛋黄）、肥肉、海鲜、无鳞鱼类、动物内脏等食品。

(8) 宜多食各种新鲜水果、蔬菜，进低脂肪、低胆固醇食品，如香菇、木耳、芹菜、豆芽、海带、藕、鱼肉、兔肉、鸡肉、鲜豆类等；宜多食干豆类及其制品；宜选用植物油，不用动物油；

(9) 少吃辣椒、生蒜等刺激性食物或辛辣食品；不用油煎、炸、烤、熏的烹调方法；饮水时，用少量山楂、银杏、绞股蓝草放入水杯中饮用。

汇总医生： 丁昊炜

主检日期： 2024-07-25

主检医生：

## 分科结果

## 身高、体重、血压

| 项目名称 | 检查结果       | 项目名称 | 检查结果 |
|------|------------|------|------|
| 身高   | 168cm      | 体重   | 81kg |
| 血压   | 120/72mmHg |      |      |

**\*小结：**

(1) 体重指数 28.70：超重

操作员：陈红锦

检查日期：2024-07-23

检查医生：名燕凌

## 检验报告

## 血流变

| 项目名称         | 检查结果  | 单位   | 参考值          | 提示 |
|--------------|-------|------|--------------|----|
| 全血粘度高切 200/s | 4.22  | mpas | 3.53--4.65   |    |
| 全血粘度中切 100/s | 4.53  | mpas | 3.6--4.9     |    |
| 全血粘度中切 50/s  | 4.98  | mpas | 4.7--5.9     |    |
| 全血还原粘度高切     | 5.62  | mpas | 3.66--8.48   |    |
| 全血还原粘度低切     | 38.66 | mpas | 31.8--50.2   |    |
| 血浆粘度         | 1.63  | mpas | 1.26--1.70   |    |
| 血沉(ESR)      | 5.80  | mm/h | 0--15        |    |
| 红细胞压积        | 0.46  | L/L  | 0.40--0.50   |    |
| 红细胞聚集指数      | 4.60  |      | 3.79--6.05   |    |
| 红细胞变形指数      | 0.69  |      | 0.51--1.02   |    |
| 红细胞刚性指数      | 3.45  |      | 2.15--6.73   |    |
| 血沉方程 K 值     | 24.52 | mm/h | 0--77        |    |
| 全血粘度 1/s     | 19.41 | mpas | 17.6--21.3   |    |
| 全血高切相对指数     | 2.59  |      | 2.08--3.69   |    |
| 全血低切相对指数     | 11.91 |      | 10.37--16.94 |    |

## \*小结:

未见异常

操作员：王小雪 检查日期:2024-07-23

检查医生:陈建国

## 尿常规

| 项目名称        | 检查结果 | 单位   | 参考值  | 提示 |
|-------------|------|------|------|----|
| 胆红素(BIL)    | -    |      | 阴性   |    |
| 隐血(ERY)     | -    |      | 阴性   |    |
| 小圆上皮细胞(SRC) | 0    | 个/ul | 0--0 |    |

|           |       |      |              |   |
|-----------|-------|------|--------------|---|
| 维生素 C     | -     |      | 阴性           |   |
| 异常红细胞     | 0     | 个/ul | 0--3         |   |
| 红细胞（正常）   | 0     | 个/ul | 0--6         |   |
| 鳞状上皮细胞    | 0     | 个/ul | 0--0         |   |
| 粘液丝       | 16    | 个/ul | 0--0         | ↑ |
| 尿葡萄糖(GLU) | -     |      | 阴性           |   |
| 酮体(KET)   | -     |      | 阴性           |   |
| 比重(SG)    | 1.015 |      | 1.003--1.030 |   |
| 酸碱度(PH)   | 7.5   |      | 4.5--8.0     |   |
| 尿蛋白质(PRO) | -     |      | 阴性           |   |
| 尿胆原(URO)  | -     |      | 阴性           |   |
| 亚硝酸盐(NIT) | -     |      | 阴性           |   |
| 尿白细胞(LEU) | -     |      | 阴性           |   |

**\*小结:**

粘液丝偏高(16 /HP)

操作员：黄璐瑶 检查日期:2024-07-23

检查医生:陈建国

**血常规（五分类）**

| 项目名称           | 检查结果 | 单位                 | 参考值        | 提示 |
|----------------|------|--------------------|------------|----|
| 白细胞(WBC)       | 7.31 | 10 <sup>9</sup> /L | 3.5--9.5   |    |
| 淋巴细胞绝对值(LY#)   | 1.76 | 10 <sup>9</sup> /L | 1.1--3.2   |    |
| 淋巴细胞百分比(LY%)   | 24.0 | %                  | 20--50     |    |
| 中性粒细胞绝对值(GR#)  | 4.94 | 10 <sup>9</sup> /L | 1.8--6.3   |    |
| 中性粒细胞百分比(GR%)  | 67.5 | %                  | 40--75     |    |
| 嗜碱性粒细胞绝对值(BA#) | 0.04 | 10 <sup>9</sup> /L | 0--0.06    |    |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BA%) | 0.6  | %                  | 0--1.0     |    |
| 嗜酸性粒细胞绝对值(EO#) | 0.25 | 10 <sup>9</sup> /L | 0.02--0.52 |    |

|                     |       |                     |            |
|---------------------|-------|---------------------|------------|
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%)      | 3.5   | %                   | 0.4--8.0   |
| 血小板(PLT)            | 237   | 10 <sup>9</sup> /L  | 125--350   |
| 血小板分布宽度(PDW)        | 16.1  | %                   | 15--17     |
| 平均血小板体积(MPV)        | 8.5   | fl                  | 6.0--14.0  |
| 血小板压积(PCT)          | 0.202 | %                   | 0.11--0.28 |
| 红细胞(RBC)            | 4.83  | 10 <sup>12</sup> /L | 4.3--5.8   |
| 血红蛋白                | 155   | g/L                 | 130--175   |
| 红细胞压积(HCT)          | 45.8  | %                   | 40--50     |
| 红细胞平均体积(MCV)        | 94.7  | fl                  | 82--100    |
| 平均血红蛋白含量(MCH)       | 32.1  | pg                  | 27--34     |
| 平均血红蛋白浓度(MCHC)      | 339   | g/L                 | 316--354   |
| 单核细胞绝对值(MO#)        | 0.32  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0.1--0.60  |
| 单核细胞百分比(MO%)        | 4.4   | %                   | 3--10      |
| 红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)  | 45.2  | fl                  | 35--56     |
| 红细胞分布宽度变异系数(RDW-CV) | 12.9  | %                   | 10.6--16.6 |
| 大血小板比率              | 16.0  | %                   | 11--45     |
| 大血小板数目              | 38    | 10 <sup>9</sup> /L  | 30--90     |
| 未成熟粒细胞数目            | 0.02  | 10 <sup>9</sup> /L  | 0--999     |
| 未成熟粒细胞百分比           | 0.3   | %                   | 0--100     |
| 有核红细胞数目             | 0.000 | 10 <sup>9</sup> /L  | 0--9999    |
| 有核红细胞百分比            | 0.00  | /100WBC             | 0--9999    |

**\*小结:**

未见异常

操作员：乔叶 检查日期:2024-07-23 检查医生:陈建国

**尿沉渣**

| 项目名称        | 检查结果 | 单位   | 参考值   | 提示 |
|-------------|------|------|-------|----|
| 白细胞尿        | 4    | 个/ul | 0--13 |    |
| 上皮细胞(EC)    | 0    | /HP  | 0--28 |    |
| 管型(CAST)    | 0    | 个/ul | 0--1  |    |
| 霉菌(尿)       | 0    | /HP  | 0--0  |    |
| 结晶          | 0    | /HP  | 0--10 |    |
| 透明度(CLA)    | 清亮   |      |       |    |
| 胆红素(BIL)    | -    |      | 阴性    |    |
| 颜色(Colour)  | 淡黄色  |      |       |    |
| 红细胞(尿)(RBC) | 0    | 个/ul | 0--6  |    |

**\*小结:**

未见异常

操作员：黄璐瑶 检查日期:2024-07-23

检查医生:陈建国

**生化全项 2**

| 项目名称             | 检查结果   | 单位     | 参考值      | 提示 |
|------------------|--------|--------|----------|----|
| 碳酸氢根(HCO3)       | 22.90  | mmol/L | 22--29   |    |
| 总蛋白(T PROT)      | 73.6   | g/L    | 65--85   |    |
| 白蛋白(ALB)         | 45.90  | g/L    | 40--55   |    |
| 球蛋白(GLB)         | 27.70  | g/L    | 15--35   |    |
| 白蛋白/球蛋白(ALB/GLB) | 1.66   |        | 1.0--2.5 |    |
| γ-谷氨酰转肽酶(GGT)    | 26.0   | U/L    | 10--60   |    |
| 碱性磷酸酶(ALP)       | 67.0   | U/L    | 45--125  |    |
| 肌酐(CREA)         | 57.00  | umol/L | 57--97   |    |
| 尿酸(UA)           | 432.00 | umol/L | 200--420 | ↑  |
| 钾(K)             | 4.12   | mmol/L | 3.5--5.5 |    |
| 钠(Na)            | 141.8  | mmol/L | 136--145 |    |
| 氯(Cl)            | 100.3  | mmol/L | 96--108  |    |

|                  |        |        |            |   |
|------------------|--------|--------|------------|---|
| 钙(Ca)            | 2.40   | mmol/L | 2.11--2.52 |   |
| 乳酸脱氢酶(LDH)       | 130.00 | U/L    | 120--250   |   |
| 淀粉酶(AMY)         | 42.00  | IU/L   | 35--135    |   |
| 葡萄糖(GLU)         | 5.39   | mmol/L | 3.89--6.1  |   |
| 总胆红素(TBIL)       | 22.20  | umol/L | 0--26      |   |
| 直接胆红素(DBIL)      | 5.3    | umol/L | 0--8.0     |   |
| 间接胆红素(IBIL)      | 16.90  | umol/L | 0--17.39   |   |
| 丙氨酸氨基转移酶(ALT)    | 20.00  | U/L    | 9--50      |   |
| 门冬氨酸氨基转移酶(AST)   | 17.00  | U/L    | 15--40     |   |
| 尿素测定 (Urea)      | 4.50   | mmol/L | 3.1--8.0   |   |
| 肌酸激酶(CK)         | 152.00 | U/L    | 50--310    |   |
| $\alpha$ -羟丁酸脱氢酶 | 121.00 | U/L    | 72--182    |   |
| 同型半胱氨酸           | 13.94  | umol/L | 0--15      |   |
| C 反应蛋白           | 4.50   | mg/dl  | 0--3       | ↑ |
| 酮体               | 0.06   | mmol/L | 0.00--0.28 |   |
| D-二聚体            | 0.55   | ug/ml  | 0--1.35    |   |
| 动脉硬化指数           | 6.39   |        | 1.31--3.19 | ↑ |
| 谷草比谷丙            | 0.85   |        | 0.4--2.5   |   |
| 高敏肌钙蛋白 (Tnl)     | 2.40   | pg/ml  | 0--46.47   |   |
| 总胆固醇(CHOL)       | 5.68   | mmol/L | 2.59--5.2  | ↑ |
| 甘油三脂(TG)         | 1.88   | mmol/L | 0.7--1.7   | ↑ |
| 低密度脂蛋白(LDL)      | 5.88   | mmol/L | 0--4.13    | ↑ |
| 高密度脂蛋白(HDL)      | 0.92   | mmol/L | 0.77--1.55 |   |

**\*小结:**

尿酸(UA)偏高(432.00 umol/L) C 反应蛋白偏高(4.50 mg/L) 动脉硬化指数偏高(6.39) 总胆固醇(CHOL)偏高(5.68 mmol/L) 甘油三脂(TG)偏高(1.88 mmol/L) 低密度脂蛋白(LDL)偏高(5.88 mmol/L)

操作员: 刘慧芳 检查日期:2024-07-23 检查医生:陈建国






Text



# 大同瑞慈健康体检

## 颅内多普勒血流图 (TCD) 检查报告单

姓名: 孙进峰      性别: 男      年龄: 49 岁      检查号: 2212270539  
 申请科室: 体检科      申请医师: 李菊蓉      检查类型: 颅内血管      床号:



Vs:      Vd:      Vm:  
 PI:      RI:      S/D:

Vs:      Vd:      Vm:  
 PI:      RI:      S/D:

Vs:      Vd:      Vm:  
 PI:      RI:      S/D:

### 医生意见

结论: 椎-基底动脉脑血管超声未见异常。

李菊蓉

检查日期: 2024-07-23


本报告单仅提供临床参考

# 大同瑞慈康复医院

## <sup>14</sup>C呼气试验检验报告

|      |     |      |                   |    |            |
|------|-----|------|-------------------|----|------------|
| 姓名   | 孙进峰 | 年龄   | 49                | 性别 | 男          |
| 住院号  | 0   | 日期   | 2024/7/23 9:42:55 | 电话 | 0          |
| 送检医生 | 曹居杰 | 样品编号 | 0534              | 编号 | 2212270539 |

### <sup>14</sup>C呼气试验



#### 阳性参考值 (Disintegrations Per Minute(DPM)):

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| DPM值: | dpm > 2499        | 阳性++++ |
|       | 1499 < dpm ≤ 2499 | 阳性+++  |
|       | 499 < dpm ≤ 1499  | 阳性++   |
|       | 149 < dpm ≤ 499   | 阳性+    |
|       | dpm ≤ 99          | 阴性     |
|       | 99 < dpm ≤ 149    | 不确定    |

**检测结果:** **dpm= 0** **阴性**

医生建议: 注意保持健康及规律饮食

温馨提示: 您本次检测的结果为阴性

检测医生: 曹居杰

## 双源 CT 诊断图文报告

流水号: 2212270539

影像号: CT20240723058

姓名: 孙进峰

年龄: 49 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 409631

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 脑部双源 CT

经典图像:



影像所见:

颅脑结构双侧对称, 脑实质内未见异常密度。中线结构居中。脑沟、裂、池及脑室系统等未见异常。

影像诊断:

颅脑未见明显异常

报告医师: 剧艳军

检查日期: 2024-07-24

审核医师: 剧艳军

报告日期: 2024-07-24

## 双源 CT 诊断图文报告

流水号: 2212270539

影像号: CT20240723059

姓名: 孙进峰

年龄: 49 岁

性别: 男

检查设备: 西门子量子双源 CT

体检号: 409631

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 肺部双源 CT

### 经典图像:



### 影像所见:

胸廓对称, 骨性肋骨完整, 胸壁软组织结构良好, 两肺支气管血管纹理走行分布良好, 支气管束结构清晰, 双肺通气良好。肺门结构未见异常。纵隔无偏移, 段以上支气管通畅。心影及大血管形态结构正常, 纵隔内未见肿大淋巴结。胸膜未见异常。

### 影像诊断:

胸部未见明显异常,

报告医师: 剧艳军

检查日期: 2024-07-24

审核医师: 剧艳军

报告日期: 2024-07-24

## 超声诊断图文报告

流水号: 2212270539

影像号: 1615921

姓名: 孙进峰

年龄: 49 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 409631

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 颈部血管彩超

经典图像:



影像所见:

右锁骨下动脉起始处、双侧颈总动脉、颈内、颈外动脉起始段内中膜不增厚, 内壁欠光滑, 管壁未见明确强回声斑。CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱形态正常。

双侧椎动脉走行正常, 椎动脉内径正常, 管壁不厚, 管腔内为无回声, CDFI: 血流充盈好。PW: 频谱正常。

|       | 内径 mm | 流速 cm/s | RI   |  |
|-------|-------|---------|------|--|
| 左侧椎动脉 | 3.8   | 39.1    | 0.65 |  |
| 右侧椎动脉 | 3.6   | 34.5    | 0.62 |  |

影像诊断:

双侧颈动脉、椎动脉未见明显异常

报告医师: 张婷婷

检查日期: 2024-07-23

审核医师: 张婷婷

报告日期: 2024-07-23

## 超声诊断图文报告

流水号: 2212270539

影像号: 1615925

姓名: 孙进峰

年龄: 49 岁

性别: 男

检查设备: Vivid E95

体检号: 409631

申请医院: 本院

体检科室: 体检科

检查部位: 全腹彩超

### 经典图像:



### 影像所见:

肝脏大小形态正常, 包膜光滑完整, 实质回声细腻、增强, 肝内管道系统走行欠清晰, 门静脉及肝内胆管不扩张。  
胆囊大小形态正常, 壁不厚、欠光滑, 囊壁探及数个高回声凸起, 较大者直径约 0.8cm, 位置固定, 后无声影, 囊内透声好, 肝外胆管不扩张。  
胰腺大小形态正常, 实质回声均匀, 主胰管不扩张。  
脾脏大小形态正常, 实质回声均匀, 脾门静脉不宽。  
双肾大小形态正常, 皮髓质分界清晰, 集合系统未见分离, 双侧输尿管未见扩张。  
膀胱充盈佳, 未见明显异常。  
前列腺形态正常, 大小约 3.0\*4.2\*2.9cm, 实质回声欠均匀。

### 影像诊断:

- 脂肪肝 (轻度)
- 胆囊息肉 (多发)

报告医师: 张婷婷

检查日期: 2024-07-23

审核医师: 张婷婷

报告日期: 2024-07-23